



本研究成果は論文掲載先であるNature Communications 誌から、以下の通り報道解禁設定があります。  
TV・ラジオ・WEB ……4月9日(金)午後6時(日本時間)  
新聞 ……4月10日(土)朝刊(日本時間)

2021年4月9日

分野: 生命科学・医学系 キーワード: 細胞生物学、薬理学、細胞間情報伝達、副甲状腺ホルモン、SLPI

## 副甲状腺ホルモンが骨量を増加するメカニズムを解明！ ～SLPI という骨形成と骨吸収のバランサーの発見～

### 【研究成果のポイント】

- ◆ 副甲状腺ホルモン(PTH)<sup>\*1</sup> は体の中の骨やカルシウムを制御する重要なホルモンである。投与のやり方によっては骨量を増加させることが知られており、現在骨粗しょう症の治療薬としても用いられているが、詳細な分子メカニズムはよくわかっていなかった。
- ◆ 今回、PTH が骨に作用すると、骨芽細胞が低分子タンパク質である SLPI(secretory leukocyte protease inhibitor)<sup>\*2</sup> を発現し、これが骨を作る骨芽細胞の骨形成機能を上げると同時に、細胞外に分泌されて、破骨細胞との相互作用(カップリング)を制御し、骨を壊す破骨細胞による骨吸収(骨破壊)を抑制することを明らかにした。
- ◆ 骨形成と骨吸収を協調的に制御する新規分子を発見したことで、骨代謝を調節する新たな骨疾患治療薬への応用が期待される。

### ❖ 概要


大阪大学大学院医学系研究科の森本彬人 特任研究員(常勤)、菊田順一 准教授、石井優 教授(免疫細胞生物学・国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 招へいプロジェクトリーダー)らの研究グループは、副甲状腺ホルモン(PTH)による骨量増加のメカニズムを明らかにしました。

生体の骨は、骨を壊す破骨細胞と骨を作る骨芽細胞が協調して働き、骨の再構築(骨リモデリング<sup>\*3</sup>)を生産にわたって繰り返すことでその強度を維持しており、様々なホルモンや薬剤によりそのバランスが調節されます。PTH には、骨吸収を促して血中にカルシウムなどのミネラルを供給する他に、骨吸収から骨形成への移行を促して骨を修復する作用があります。しかし、PTH が骨芽細胞と破骨細胞を協調的に制御する分子メカニズムについて、これまでその詳細な機序は明らかにされてきませんでした。

本研究グループは、これまでに独自で開発した生体イメージング技術<sup>\*4</sup>により、生体内での骨リモデリングの様子を可視化し、PTH が骨芽細胞と破骨細胞の細胞間相互作用を促すことを明らかにしてきました。今回、研究グループはPTH 投与後の骨芽細胞の遺伝子発現を網羅的に解析し、骨芽細胞内で SLPI というタンパク質の発現が亢進し、

さらに PTH が SLPI を介して骨量を維持していることを発見しました。さらに、SLPI には 1.骨芽細胞による骨形成を促す作用、2.破骨細胞を骨芽細胞の近くに引き寄せて骨吸収を抑制する作用、の二つの役割があることを見出しました(図1)。今回の研究成果によって、骨粗しょう症など骨疾患の治療により効果的な治療薬開発の進展につながることを期待されます。

本研究成果は、英国科学誌「Nature Communications 誌」に、4月9日(金)午後6時(日本時間)に公開されます。



Press Release



❖ 研究の背景

骨の構造と機能は、破骨細胞による骨吸収と骨芽細胞による骨形成を繰り返し、自ら再構築することによって、その強靭さとしなやかさを維持しています。骨吸収と骨形成のバランスが崩れると、骨粗しょう症や骨硬化症などの骨疾患が発症し、骨は脆弱になります。そのため、骨吸収と骨形成のバランスをいかに保つかということは、骨のメンテナンスを考える上で非常に重要です。

PTH は、骨吸収から骨形成への移行(骨カップリング)を促進することで骨量を増やすことが知られており、骨粗しょう症治療薬の要として広く世界で使われています。本研究グループは過去に、生体骨組織イメージング技術を独自に開発し、PTH の薬効評価を行ったことがあります。PTH を投与したマウスでは、薬剤を投与していない群と比較して、骨芽細胞と破骨細胞の細胞間相互作用が増加し、骨吸収を抑制することが分かっています。しかし、PTH がどのように骨吸収と骨形成を同時に制御しているのか、その詳細な分子メカニズムは明らかになっていません。

❖ 本研究の成果

本研究グループは、骨芽細胞と破骨細胞の細胞間相互作用に関わる分子メカニズムを検討するために、PTH を連日投与したマウスから骨芽細胞を分離し、次世代シーケンサーを用いた網羅的遺伝子発現解析を行いました。その結果、創傷治癒やタンパク分解酵素に関わる遺伝子の多くが PTH によって発現変動していることを見出し、その中でもセリンプロテアーゼ阻害作用をもつ低分子タンパク質 SLPI の発現が最も顕著に増加していることが分かりました。次に、SLPI を欠損したマウスを用いて、SLPI が PTH の骨量増加作用に与える影響を解析したところ、SLPI 欠損マウスでは野生型マウスと比較して PTH の骨量増加作用が有意に減少していました(図2)。SLPI が欠損したマウスでは PTH 投与下で、骨吸収が亢進し、骨形成が減弱していました。このことから、PTH が骨吸収と骨形成のバランスをとる中で、SLPI は骨吸収に傾きすぎないように骨代謝を調節していることが明らかになりました。SLPI を過剰に発現させた骨芽細胞は盛んに細胞分裂を行うほか、Runx2 や Osterix という骨芽細胞機能に必須のタンパク質の発現が高いことが分かりました。さらに、SLPI を過剰に発現した骨芽細胞は、破骨細胞との細胞間接着能が高く、細胞間相互作用により骨吸収を抑制することが分かりました。最後に、本研究グループは、独自に開発した生体骨組織イメージング技術を用いて、SLPI を欠損したマウスでの破骨細胞と骨芽細胞の相互作用を解析しました。その結果、PTH 投与下において、SLPI 欠損マウスでは野生型マウスと比較して、骨芽細胞と破骨細胞の細胞間相互作用の頻度が小さいことが明らかとなりました(図3)。以上の結果から、SLPI は骨芽細胞に直接的に作用して骨形成を促進しているほか、骨芽細胞と破骨細胞の細胞間相互作用を増加することで骨吸収と骨形成の両面を制御していることが明らかになりました。



## Press Release

### ❖ 本研究成果が社会に与える影響（本研究成果の意義）

骨粗しょう症の治療では、骨吸収を抑える薬剤に比べて骨形成を促進させる薬剤は限られており、骨を再生させる治療薬の開発が望まれています。本研究成果は、骨疾患治療薬であるPTH製剤の臨床的意義をさらに高めるとともに、骨粗しょう症など骨疾患の治療により効果的な骨疾患治療薬の開発につながる事が期待されます。

### ❖ 特記事項

本研究成果は、2021年4月9日(金)午後6時(日本時間)に英国科学誌「Nature Communications 誌」(オンライン)に掲載されます。

【タイトル】“SLPI is a critical mediator that controls PTH-induced bone formation”

【著者名】森本 彬人 1,2, 菊田 順一 1,2,3, 西川 恵三 1,2, 数藤 孝雄 1,2, 上中 麻希 1,2, 古家 雅之 1,2, 長谷川 哲雄 1,2, 橋本 国彦 1,2, 塚崎 裕之 1,2, 瀬尾 茂人 4, 中村 晃 5, 奥崎 大介 2,6, 杉原 文徳 7, 二宮 彰紀 7, 吉村 健史 8, 高尾 亮子 9, 松田 秀雄 4, 石井 優 1,2,3\* (\*責任著者)

- 【所属】
1. 大阪大学 大学院医学系研究科 免疫細胞生物学
  2. 大阪大学 免疫学フロンティア研究センター
  3. 医薬基盤・健康・栄養研究所 創薬イメージングプロジェクト
  4. 大阪大学 大学院情報科学研究科 バイオ情報工学
  5. 東北医科薬科大学 医学部 免疫学
  6. 大阪大学 微生物病研究所 遺伝情報実験センター
  7. 大阪大学免疫学フロンティア研究センター 中央実験室
  8. 旭化成ファーマ株式会社 Medical Affairs Department
  9. 旭化成ファーマ株式会社 Pharmaceuticals Research Center

本研究成果は、国立医療研究開発機構(AMED)の先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業における「生体組織イメージングに基づいたバイオ医薬品の新規評価基盤技術の開発」(研究代表者:石井優 教授)の一環として得られました。

### ❖ 用語説明

#### ※1 副甲状腺ホルモン(PTH)

もともとは骨吸収を促進することで血液中のカルシウム濃度を上げる作用が知られていた。しかしながら、投与方法によっては骨量を増加させることが示され、2010年に、ヒト副甲状腺ホルモン 1-34(テリパラチド)が骨粗しょう症治療薬として製造販売承認された。PTH製剤は、骨形成を促進する薬剤として初めて承認された。強力な骨形成作用により、十分な骨量増加が得られ、優れた骨折予防効果が証明されている。

#### ※2 SLPI (secretory leukocyte protease inhibitor)

組織傷害時に、主に白血球が分泌する代表的なセリンプロテアーゼインヒビター。炎症の後期で発現が上昇し、炎症を抑制するとともに組織再生を誘導することが知られている。近年、骨でも発現していることが報告されていたが、生体骨組織内での作用は分かっていなかった。

#### ※3 骨リモデリング

骨の再構築は破骨細胞分化により開始され、破骨細胞により古い骨が溶かされる。その後、骨芽細胞により新しい骨が造られ、溶かされた部分が完全に覆われる。この一連のサイクルが繰り返されることで骨量が維持されている。この骨の再構築を骨リモデリングとよぶ。

#### ※4 生体イメージング技術

## Press Release

実験動物を生かしたまま顕微鏡に乗せ、臓器内部の細胞や分子の動きをリアルタイムで解析する手法。特殊な顕微鏡を使用することで、硬い石灰質に囲まれた骨の内側を生きたまま観察し、骨リモデリングを行う細胞の挙動を解析することができる。

### ❖ 本件に関する問い合わせ先

＜研究に関すること＞

石井 優(いしい まさる)

大阪大学 大学院 医学系研究科 免疫細胞生物学 教授

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 招へいプロジェクトリーダー

TEL : 06-6879-3881 FAX : 06-6879-3889

E-mail : [mishii@icb.med.osaka-u.ac.jp](mailto:mishii@icb.med.osaka-u.ac.jp)

＜AMED 事業に関すること＞

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)

創薬事業部 医薬品研究開発課 先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業担当

TEL : 03-6870-2219

E-mail : [sentan-bio@amed.go.jp](mailto:sentan-bio@amed.go.jp)

＜報道に関すること＞

大阪大学大学院医学系研究科 広報室

TEL: 06-6879-3388 FAX: 06-6879-3399

Email : [medpr@office.med.osaka-u.ac.jp](mailto:medpr@office.med.osaka-u.ac.jp)

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 戦略企画部

TEL:072-641-9832 FAX:072-641-9821

Email: [kikaku@nibiohn.go.jp](mailto:kikaku@nibiohn.go.jp)